

Aigle botté 'forme pâle' vs. Aigle de Wahlberg 'forme pâle'

Une adaptation des commentaires de Ralph Buij, Rob Davies et Simon Thomsett

Ces deux petits aigles ont, dans leur forme pâle respective, **les parties inférieures claires contrastant avec les rémiges sombres**. Un troisième petit aigle masqué que nous pourrions considérer ici est l'Aigle d'Ayres *Hieraaetus ayresii*, mais celui-ci ne présente pas de contraste entre couvertures sous-alaires pâles et rémiges sombres.

Silhouette en vol : Pour moi (JB), les ailes de l'Aigle de Wahlberg paraissent plus longues que celles de l'Aigle botté. La tête et le cou de l'Aigle botté sont plus courts que chez le Wahlberg. La tête proéminente de l'Aigle de Wahlberg, combinée avec sa longue queue souvent maintenue fermée donne à cet aigle une silhouette « en croix » : la tête et le cou dépassant nettement le bord d'attaque (antérieur) de l'aile et la queue considérablement le bord de fuite (postérieur) de l'aile.

Tête : Les Aigles bottés pâles ont toujours la tête et les joues brun-clair et la gorge blanche ou pâle, mais jamais un masque oculaire sombre comme chez le Wahlberg. Les Aigles bottés n'ont également pas la tête aussi proéminente ni les commissures descendantes qui donnent un « air triste » (mais ce critère n'est visible que de près) aux Aigles de Wahlberg.

Dessin alaire : Un bon critère diagnostique est la présence de rémiges internes claires chez l'Aigle botté, qui n'apparaissent jamais nettement visibles chez l'Aigle de Wahlberg.

Motif de la queue : Les Aigles bottés pâles ont la queue gris-pâle non barrée ou barrée uniquement sur les rectrices centrales, à l'inverse de l'Aigle de Wahlberg dont toutes les rectrices sont barrées et qui en général montre aussi une bande terminale sombre.

Parties supérieures : Un bon critère diagnostique de l'Aigle botté est également la présence, chez les deux formes (sombre et pâle) d'une zone diagonale brun pâle aux couvertures sus-alaires du bras, de scapulaires en partie pâles et d'une marque brun pâle également aux sus-caudales (croupion). Les parties supérieures de l'Aigle de Wahlberg seront entièrement sombres (forme sombre) ou avec un léger contraste entre rémiges sombres et couvertures et dos bruns (forme pâle).

Occurrence : Au Niger, l'Aigle de Wahlberg est essentiellement un visiteur de saison des pluies, alors que l'Aigle botté sera plutôt présent en saison sèche, mais il peut y avoir chevauchement.



Copyright photos Thomas Rabeil, Sahara Conservation Fund.

Aigle botté forme pâle dans le massif de Termit, Septembre 2011. Notez les côtés de la tête brun-clair, la gorge pâle et l'absence de masque oculaire sombre (comparez avec les photos ci-dessous). Notez également les rémiges primaires internes plus pâles (plus visible sur la photo de gauche grâce au meilleur éclairage) et l'absence de barres à la queue (en particulier sur les rectrices externes).



Copyright photos : Thomas Rabeil, Sahara Conservation Fund.

Aigle de Wahlberg 'forme pâle', Parc transfrontalier du W, Septembre 2011. Notez la tête très proéminente (surtout sur la photo de gauche ci-dessus) et pâle, avec le masque noir autour des yeux et l'absence de primaires internes pâles (bien que ce critère soit parfois difficile à apprécier). Notez également la queue nettement barrée.

Notez enfin les commissures nettement tournées vers le bas (« air triste ») sur la photo à droite ci-contre (Aigle de Wahlberg 'forme sombre'). Parc International du W, September 2011.

Copyright photo : Thomas Rabeil, Sahara Conservation Fund.

